Item 92 – Rachialgies

Cervicalgies communes, origine dégénérative

Présentation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Douleurs : Siège diffus, +/- impulsivité à la toux, Rythme mécanique mais souvent prédominance nocturne, Episodes antérieurs, points douloureux à la palpation, muscles spinaux douloureux (contracture voire attitude antalgique) ▪ Mobilité du cou réduite en aigu, +/- craquements ▪ FdR : activité à type de traumatismes ou microtraumatismes répétés, postures prolongées, sédentarité, trb statique rachidienne, tabac, génétique
Bilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Radios standards : uniquement si drapeaux rouges, douleurs rebelles au Tt, évoluant vers aggravation ▪ IRM si drapeaux rouges
Etiologies / tdx cliniques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cervicalgies d'origine discale : sujets jeunes, ATCD traumatiques, très algique, raideur et contracture cervicales, attitude antalgique, impulsivité <u>Complication</u> : névralgie cervicobrachiale, (compression médullaire) ▪ Cervicalgies d'origine arthrosique : patients âgés, association de discarthrose, arthrose des zygapophysies, uncarthrose. Tableau plus torpide +/- épisodes aigus, pas de raideur rachidienne majeure <u>Complications</u> : névralgie cervico-brachiale, syndrome de compression médullaire lente (= canal rachidien rétréci + claudication médullaire)

Pronostic	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Favorable après pls jours ▪ Risque de passage à chronicité : contexte biopsychosocial
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cervicalgie aigüe : Antalgiques, AINS +/- collier cervical antalgique ▪ Cervicalgies chroniques : antalgiques, AINS, REEDUCATION, +/- psychotropes

Dorsalgies

Interrogatoire et examen clinique	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trouble de la statique du rachis ?, points douloureux vertébraux et paravertébraux ? ▪ Evaluation mobilité en flexion/extension, mesure ampliation thoracique
Bilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Radios ++ ▪ Si doute : signes biologiques d'inflammation, Rx thoracique, ECG, scinti osseuse, endoscopie oesogastroduodénale, échographie abdominale, scanner, IRM
Etiologie	<ul style="list-style-type: none"> → Scoliose : asymptomatique, évolutive lors croissance, max à adolescence, lésions dégénératives possibles lors du vieillissement → Maladie de Scheuermann : épiphysite de croissance, altérant plateaux vertébraux, asymptomatique, +/- dégénérescences discales ultérieures. Cyphose de Schmorl : maladie de Scheuermann se compliquant d'une arthrose vertébrale antérieure lors vieillissement → Hernie discale : parfois post-traumatique, syndrome lésionnel et sous-lésionnel +/- → Arthrose costovertébrale : favorisée par trb de statique vertébrale, asymptomatique → Arthrose des zygapophysies : favorisée par trb de statique vertébrale
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Causes viscérales et dorsalgies secondaires : tt spécifiques ▪ Dorsalgies mécaniques : tt symptomatique et kinésithérapie

Lombalgies communes, origine dégénérative

Présentation	<ul style="list-style-type: none">70%, 50-65 ans, récurrences fréquentesDouleur lombaire basse (lombo-fessière++), irradiations douloureuses, rythme mécanique, impulsivité ? ATCD lombalgiques ?Trouble de la statique rachidienne ? points douloureux à la palpation ? étude des mobilités du rachis lombaire (raideur dans le lumbago, mobilités subnormales si chronique)Syndrome cellulomyalgique ? => oriente vers zygapophysiesFdR : activité à type de traumatismes ou microtraumatismes répétés, postures prolongées, sédentarité, trb statique rachidienne, tabac, génétique
Bilan	<ul style="list-style-type: none">Radio si drapeaux rouges, douleurs rebelles au Tt, évolution vers aggravationIRM si drapeaux rouges
Etiologies / tbc cliniques	<ul style="list-style-type: none">Lombalgies discales : 20-60 ans, lors effort ou trauma, ATCD similaires, lombalgie médiane, mécanique, impulsive, contracture musculaire avec attitude antalgique <u>Complications</u> : radiculalgies dans le MI, rare cimpression de la queue de chevalLombalgies d'origine arthrosique : patients âgés, association discarthrose et arthrose des zygapophysies, pas de raideur rachidienne majeure, âge > 50 ans, lombalgie médiane ou unilatérale, mécanique, favorisée par hyperextension, le procubitus, améliorée par antéflexion, douleurs référées à distance, hyperesthésie au « palper-rouler », facteurs favorisants (hyperlordose, surpoids, syndrome trophoblastique, scoliose, dysplasies, instabilités discovertébrales) <u>Complications</u> : radiculalgie, canal rachidien rétréci avec claudication radiculaire
Pronostic	<ul style="list-style-type: none">Favorable après pls joursRisque de passage à chronicité : contexte biopsychosocial
Traitement	<ul style="list-style-type: none">Cervicalgie aiguë : Antalgiques, AINS +/- corset lombaire antalgiqueCervicalgies chroniques : antalgiques, AINS, REEDUCATION, +/- psychotropes+/- infiltrations cortisoniques au niveau des zygapophysiesChirurgie exceptionnelle

Rachialgies secondaires, origine non dégénérative

Présentation	<ul style="list-style-type: none">Début insidieux, évolution progressivement croissanteRythme inflammatoire insomniantRebelle aux Tt symptomatiques, intensité des douleurs, localisation multiple, ctx, ATCD
Bilan	<ul style="list-style-type: none">RadiosIRM +++/- Scinti osseuse
Etiologies	<ul style="list-style-type: none">Tumorales : métastase, localisation myélomateuse, tumeur primitive vertébraleInfectieuses : spondylodiscitesInflammatoires : spondyloarthrite, PR, chondrocalcinose, rhumatisme à apatiteNeurologiques : tumeur intrarachidiennePost-traumatiques : fractures et luxations <p>○ Cervicalgies secondaires : + tumeur de la fosse postérieure, Douleurs référées d'origine ORL ou cervical antérieur</p> <p>○ Dorsalgie secondaire, non mécanique : + Spondylarthrite, fracture vertébrale ostéoporotique, tumeur maligne, maladie de Paget, pathologie d'origine viscérale (cardiovasculaire : <i>insuffisance coronarienne, péricardite, anévrisme, dissection</i> ; pleuropulmonaire : <i>KC bronchique, pleurésie, tumeur médiastinale</i> ; digestive : <i>ulcère gastrique ou duodénal, affection hépatobiliaire, oesophagite, pancréatite, gastrite, KC estomac/œsophage/pancréas</i>)</p> <p>○ Lombalgies secondaires : + douleurs lombaires référées (anévrisme AA pathologie des voies urinaires, tumeur digestive, pancréatite chronique, tumeur pelvienne, ADP ou fibrose rétropéritonéale)</p>
Pronostic	<p>Drapeaux rouges :</p> <ul style="list-style-type: none">Contexte infectieux, inflammatoire rhumatismal, néoplasiqueSymptômes : fièvre, fatigue générale, sudations nocturnes, perte de poids, ADP, douleurs nocturnes inflammatoires de reposImmunosuppression, corticothérapie, toxicomanie