

PHARMACO - ANTIHYPERTENSEURS

Les antihypertenseurs ont une action VD -> diminution RPT -> diminution PA

7 familles : DIU, **centraux**, BB, **alpha-bloq**, IC, IEC, ARA2

Fr : 10,2M sous au moins 1 antihypertenseur

ANTIHYPERTENSEURS	INDICATIONS	EI
IC DHP	- HTA - Angor	- OMI - Flush, céphalées (début) - Tb urinaire - Hypertrophie gingivale
IC NON DHP (diltiazem, verapamil)	- HTA, Angor - Tb rythme - Sd Raynaud	- OMI - constipation (verapamil) - Tb de conduction si IR
IEC	- HTA - Prévention néphropathie DT1 - Prévention IC sympto chez patients ayant dysfct VG asympto - Prev 2r IdM/revasc	- Toux (20%) même plusieurs semaines après début ttt - Angio-oedeme (3x + que AA2). Le plus svr sans SDRA. tabac, peau noire, diabète - hyperK+ si asso à DIU anti-aldo (spironolactone) chez sujet âgé +ARA2
SARTANS	- HTA - Prévention néphropathie DT2 - IC sympto..." qd IEC CI - LOSARTAN : réduction du risque d'AVC chez adultes hypertendus avec HVG	fq = à celle du placebo - p/r IC : moins d'hypoK+, d'OMI - IRA doit faire chercher néphropathie vasculaire - CI femme enceinte T2 + T3
DIU ANSE	- IC - IRé - HTA + IRé - Sd oedémateux	- hypercréat, uricémie - hypoK+ / Ca2+
DIU THZ (indapamide)	HTA, IC	- hypercréat, uricémie, gly, CT - hypoK+, calciurie - hypoNa+ : ++ femme âgée, boissons abondantes, régime sans sel, IRS
DIU ANTIALDOSTÉRONE (spironolactone)	- HTA, IC - HTA + hyperaldostéronisme 1r - Ascite	- hypercréat / K+ - gynécomastie, tb des règles
BB	- HTA essentielle - IC chronique stable avec FEVG altérée en asso avec IEC/DIU - Prévention angor d'effort - TSV paroxystiques	- asthénie d'effort ++ - Sd Raynaud et dysfct érectile rare

Prescriptions :

Amlodipine > Lercadipine > Verapamil...


Perindopril > Ramipril...

Irbesartan > Candesartan...

Bisoprolol > Nebivolol > Atenolol


I. ANTAGONISTES CALCIQUES :

Dihydropyridine Vasodilatateur tachycardisant	Non DHP Vasodilatateur bradycardisant
• Amlodipine 5mg 10mg • Lercanidipine 10 mg 20 mg • Felodipine 5 mg LP • Nitrendipine 20 mg 50 mg LP • Nifedipine 20 LP	• Diltiazem 60mg 200 mg LP 300 mg LP • Verapamil 120 240 LP




Les **IC non DHP** sont utilisés en cas de CI aux BB

Les OMI induits par les IC sont **insensibles aux DIU** et diminuent avec AA2/IEC (+ fav par la chaleur)



Logimax : Felodipine 5 mg LP + Metoprolol 49 mg LP

Les anti-hypertenseurs qui ciblent le système rénine angiotensine



II. IEC :

attention les :

- IEC diminuent l'angiotensine 2 et augmentent la bradykinine
- ARA2 **augmentent l'angiotensine 2** et pas d'action sur bradykinine

Ok chez > 70 ans avec surveillance de la fct rénale (risque IRA)

Débuter à dosage :

- **normal si HTA**
- Faible si IC (risque hypotension de 1re dose). CI chez femme enceinte (++T2 et T3)

III. ARA2 :

Ils bloquent le récepteur AT1. Ce sont des antagonistes et non des inhibiteurs.

Ok chez > 70 ans avec surveillance de la fct rénale (risque IRA)

prévention CV ARA2 > IEC

IV. DIU :

Diurétique de l'anse	Diurétique thiazidique	Diurétique antialdostérone
• Natriurétique forte - branche ascendante de l'anse de Henlé • Kaliurétique modérée • Durée 6 H	• Natriurétique modérée - Segment cortical de dilution • Kaliurétique forte • Durée 24 H	• Natriurétique faible • Hyperkaliémiant - tube contourné distal • Durée 3 jours

V. BB :

1. Action BDCI- :

- B- : bathomotrope -> réduit l'excitabilité
 - C- : chronotrope -> diminue la fréquence
 - D- : dromotrope -> ralentit conduction AV
 - I- : inotrope -> dépression myocardique
- => diminution de la consommation d'O₂ ; anti-ischémique

2. Action anti-hypertensive

- baisse DC
- Libération d'**ANP**
- Augmentation de la sensibilité des baro-Ré
- Baisse de la libération périphérique de NA, des RPT
- **Baisse du tonus S** -> baisse de la sécrétion de rénine

Ok chez < 60 ans présentant HTA avec signes d'adrénergisme
Efficacité pour la prévention CV p/r placebo

CI :

- IC aigüe / décompensation
- BAV2/3
- BC symptomatique
- Asthme sévère
- Forme svr tb **artériels** périphériques occlusifs / sd Raynaud (ok pour AOMI stable)
- Phéochromocytome non traité

bénéfices du ttt antihypertenseur pour une baisse de -10/-5 mmHg pendant 5 ans :

IC -46%

AVC -37%

IdM -22%

Mortalité CV -20%

Toute cause de mortalité -12%

Traitements de l'HTA :

ce qu'il faut savoir

- L'action anti-hypertensive d'un régime avec diminution du sel est de -4/-2 mmHg (pour une diminution de 5 g de sel/j)
- action anti-hypertensive d'une monothérapie = - **10/-5 mmHg** (PAS/PAD)
- 5 familles pharmacologiques ayant démontré un bénéfice sur la prévention des complications CV p/r placebo : DIU THZ, BB, IEC, AA2, IC
- Un BB (aténolol) est **moins efficace pour la prévention des AVC** qu'un IC (amlodipine) ou qu'un **AA2** (losartan) **chez les hypertendus de plus de 60 ans**
- HAS 2016 : début par une monothérapie et bithérapie après **4s** si la PA est non contrôlée
- Depuis 2017, tous les antihypertenseurs sont génériques en France

1 ^{ère} Génération	Non-cardio-sélectif	Propranolol
2 ^{ème} Génération	β ₁ -sélectif	Aténolol Metoprolol Betaxolol Bisoprolol
3 ^{ème} Génération	Propriété complémentaire (vasodilatation)	Carvedilol Celiprolol Nebivolol

PHARMACO - ANTIHYPERTENSEURS

erreurs à ne pas faire

- Pas de décision de débuter un tt sans une automesure/MAPA (HTA blouse blanche)
- Pas de régime « sans sel » chez l'**hypertendu sans IC**
- Pas de début de ttt par un médicament n'ayant pas démontré un bénéfice sur la prévention des complications CV
- Pas de faible dose d'un IEC pour débuter le ttt dans l'HTA, mais faible dose pour débuter le ttt dans l'IC
- Pas de BB pour débuter le ttt chez un **hypertendu > 60 ans**
- Pas de prescription de furosémide pour ttt l'HTA **en l'absence d'IRé sévère ou d'IC**
- Pas de prescription en 1x/j pour les antihypertenseurs avec T1/2 courte (**nicardipine, captopril**)