

*Donnez une définition du terme « apraxie » ; citez les principaux éléments de l'examen clinique d'un patient apraxique ; et citez et définissez brièvement les 4 principaux types d'apraxie (éléments de réponse dans cours polycopié)*

Définition :

Trouble résultant de la perturbation des fonctions qui régulent l'exécution des gestes à un niveau élaboré. Il correspond à un trouble de la réalisation du geste en l'absence de déficit sensitivomoteur, de trouble de la coordination, de trouble de la compréhension ou de la reconnaissance, et de déficit intellectuel important.

Examen clinique :

- ⌚ Réalisation successive par le patient de gestes uni ou bi-manuels
- ⌚ Etude de 4 grandes variétés de gestes dont la réalisation sera évaluée sur commande verbale et sur imitation :
  - gestes sans signification : boucles entre croisées avec le pouce et l'index, index et majeur écartés en V les autres doigts repliés dans la main
  - gestes symboliques du type « montrez comment on fait » : un salut militaire, un pied de nez, un au revoir, un applaudissement
  - Gestes transitifs figurés du type « imaginez que : vous avez un peigne dans la main, une brosse à dents, une clé, un clou, et un marteau, un tire bouchon et une bouteille, faites semblant »
  - Gestes transitifs avec objets réels : « prenez un objet et utilisez le »
- ⌚ Evaluation de la capacité du patient à reconnaître le geste correspondant à une consigne verbale parmi une série de gestes

4 principaux types d'apraxie :

**Apraxie idéomotrice** : perturbation de la réalisation sur commande verbale de gestes simples sans utilisation d'objet. Elle se manifeste pour les gestes symboliques ou transitifs figurés. Il peut s'agir de simplification d'approximation ou d'une impossibilité complète. **Elle est généralement secondaire à une lésion pariétale de l'hémisphère dominant.**

**Apraxie idéatoire** : perturbation de la réalisation de gestes complexes se manifestant dans l'utilisation d'objets réels. **Elle s'observe pour les lésions étendus du carrefour pariéto-occipital gauche ou bi-pariétal ou au cours des démances.**

**Apraxie constructive** : trouble des capacités spatio-constructives se manifestant dans le domaine graphique et dans le maniement des relations spatiales

**Apraxie réflexive** : impossibilité de réaliser sur imitation des gestes sans signification symbolique ou pratique. Elle se voit dans le syndrome frontal et les démances.