

	Maladie	Parasite	Classe	Cycle	Répartition	Contamination
	Toxoplasmose	Toxoplasma Gondii	Protozoaire	Direct long	Cosmopolite	
	Paludisme	Plasmodium		Indirect à HIP	Tropical	Piqûre de l’anophelle
Protozoaires intestinaux et hépatiques	Amibiase	Entamoeba histolytica	Protozoaire rhizopodes	Direct Court		Autocontaminat° feco-oral
	Giardiose	Giardi intestinalis	Protozoaire flagellé		Cosmopolite	
Vers intestinaux	Oxyurose	Enterobius vermicularis	Némathelminthe			
	Trichocéphalose	Trichuris-trichiura			Cosmopolite	Ingestion d’oeufs
	Ascarirose	Ascaris lumbricoïdes			Cosmopolite	Ingestion d’oeufs
	Anguillrose	Strongyloide stercoralis			Tropicale / Sub T.	Trans-cutanée
	Ankylostomose	Ancylostoma duodenale Necator Americanus			Tropique du cancer (mines)	Trans-cutanée
	Taeniasis	Taenia saginata	Plathelminthes	Indirect à HIP	Cosmopolite	Ingestion d’oeufs
		Bilharzioses			Schizotosoma	Tropical
	Trichinellose	Trichinella	Némathelminthe	Indirect à HIP	Cosmopolite	Ingestion de larves
	Toxocarose	Toxocara cani				Ingestion d’oeufs
	Leishmaniose	Leishmania	Protozoaire flagellé	Indirect à HIP	intertropical	Piqûre de phlébotome
	Chagas	Trypanosome américain			Amérique C. & S.	