UE1 - Chimie Générale : Atomistique

Thomson 1897 : découverte de l'électron

- Modèle plum-pudding : atome = sphère remplie d'une substance électriquement positive et fourrée d'électrons négatifs

Rutherford 1912 : découverte du noyau => atome = espace vide + partie centrale dense chargée positivement (noyau)

- Modèle d'atome planétaire

Découverte des nucléons : proton, interaction forte, neutron

Gell-Mann et Zweig 1969 : nucléons ne sont pas des particules élémentaires => quarks

- Proton = 2 quarks up + 1 quark down
- Neutron = 1 quark up + 2 quarks down

Structure de l'atome :

$$q_e = -1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$R_{\text{atome}} \sim 10^{-10} \text{ m}$$

$$m_e = 9.1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

$$R_{\text{noyau}} \sim 10^{-15} \text{ m}$$

$$q_p = e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$q_n = 0$$

$$m_p = m_n \sim 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$m_n = 1839 m_e$$

$$m_D = 1836 m_e$$

Structure de l'atome :

Nucléide :

$$A = Z + N$$

Même nombre

de protons = même élément / même nom

Isotopes : même numéro atomique Z mais A différents

Z = numéro atomique

A = nombre de masse

Masse atomique réelle = masse d'un atome réel (kg ou u.m.a) $\Leftrightarrow$ 1 atome de C pèse 1.99625×10^{-26} kg et 1 mole vaut 12g/mol $\Rightarrow N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Remarques :

- 1 u.m.a ~ masse d'un proton ~ masse d'un neutron
- Mole = quantité de masse d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12g de C

Masse atomique moyenne	$M = \frac{\sum_i \tau_i M_i}{\sum_i \tau_i}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4, \dots$ = abondance des # isotopes ▪ M_1, M_2, M_3 = leurs masses atomiques respectives
Masse molaire d'un élt	Masse atomique réelle de 1 atome du nucléide ^{14}N ~ 14 u
Masse molaire d'une mol	Somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule

Modèles utilisés :

- **Modèle de Rutherford :** e- décrit orbite circulaire centrée sur noyau immobile
- **Modèle de Bohr :**
 - 1) e- ne peut se situer que sur certaines orbites précises de sorte que son énergie reste constante
 - 2) lorsqu'il absorbe ou perd de l'énergie, e- change d'orbite ou de niveau d'énergie

Nombres quantiques :

- 1) **n**, nombre quantique principal $n=1,2,3,\dots,\infty$ (si $n=\infty$ l'e- a été éjecté de l'atome)
 - quantifie NRJ de e-
 - définit une **couche électronique** ou un **niveau d'NRJ**
- 2) **l**, nombre quantique secondaire
 - **Sommerfeld** améliore théorie de Bohr grâce aux orbites permises elliptiques
 - A chaque orbite d'une valeur n, on peut associer plusieurs **orbites elliptiques**
 - Chaque orbite empirique est caractérisée par nombre entier l : $0 \leq l \leq n - 1$
 - l caractérise la **forme de l'orbitale** : définit une **sous-couche électronique** / sous-niveau d'NRJ
- 3) **m_l**, nombre quantique magnétique
 - plan de orbite ne peut avoir que **certaines orientations** par rapport à la direction du champ

n	1	Couche K
	2	Couche L
	3	Couche M
l	0	Sous-couche s
	1	Sous-couche p
	2	Sous-couche d
	3	Sous-couche f

→ orientations quantifiées par nombre entier m_l tel que : $-l \leq m_l \leq l$, qui définit l'orientation de l'orbitale :

$l=0 \Rightarrow m_l=0 \Rightarrow$ 1 seule orientation $\Rightarrow$ 1 orbitale s $\Rightarrow$ 1 case quantique
 $l=1 \Rightarrow m_l = -1 ; 0 ; 1 \Rightarrow$ 3 orientations $\Rightarrow$ 3 orbitales p de même NRJ $\Rightarrow$ 3 cases quantiques

4) **s**, nombre quantique de spin

→ $s = +1/2$ dû à la rotation de e- sur lui-même

→ 2 orientations possibles : $m_s = +1/2$ ($\uparrow$) et $m_s = -1/2$ ($\downarrow$)

Représentation graphique :

- 1) Représentations graphiques des orbitales atomiques correspondent aux directions dans lesquelles la densité électronique est faible ou nulle
- 2) Comportement de e- d'NRJ E est décrit par 1 fct d'onde ψ . Les signes + et - correspondent aux signes de cette fonction
- 3) Densité électronique est égale au carré de la fct d'onde qui caractérise un e- dans une orbitale donnée

Structure électronique des atomes :

Diagrammes d'NRJ :

Atomes : $E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -\frac{1}{n^2} * K = -\frac{1}{n^2} * 13,6 \text{ (eV)}$ $\Leftrightarrow$ K constante 1eV = 1.6×10^{-19} J

Hydrogène et hydrogénoïdes (hydrogénoïde = 1 seul e- mais Z#1) : $E_{(eV)} = -13,6 * \frac{Z^2}{n^2}$

E ne dépend que de n ; il y a dégénérescence d'NRJ pour les sous-couches s, p, d, f d'une même couche électronique $\Leftrightarrow$ même NRJ pour s, p, d, f s'ils appartiennent à la même couche

Atomes polyélectroniques : E dépend de n et de l : il y a levée de la dégénérescence des sous-couches s, p, d et f d'une même couche électronique

Transition entre niveaux d'NRJ : quand un e- change de niveau d'NRJ, on a absorption ou émission d'un photon d'NRJ

Ecart d'NRJ = $|\Delta E| = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$ avec h = constante de Planck = 6.626×10^{-34} J.s

Répartition des électrons ou configuration électronique

1) Principe d'exclusion de Pauli : 2 e- d'un même atome ne peut pas avoir leurs quatre nombres quantiques identiques

2) Principe de stabilité : à l'état fondamental, un atome se trouve dans son état énergétique le plus stable correspondant à l'énergie la plus basse

Règle de Klechkowski (n+l) minimal

n \ l	1	2	3	4	5	6	7
0	1s	→ 2s	↘ 3s	↘ 4s	↘ 5s	↘ 6s	↘ 7s
1		2p	↘ 3p	↘ 4p	↘ 5p	↘ 6p	↘ 7p
2			3d	↘ 4d	↘ 5d	↘ 6d	↘ 7d
3				4f	↘ 5f	↘ 6f	↘ 7f

Cas des sous-couches 4s et 3d : e- occupent d'abord 4s avant 3d ; de même pour 5s avant 4d

1. Parmi les sous-couches encore vide, la 1^{ère} à se remplir est celle pour laquelle (n+l) est la plus faible
2. Si 2 sous-couches vides sont caractérisées par la même valeur de la somme (n+l), celle de plus faible nombre quantique principal n se remplit en premier

Nombre d'e- de valence :

- Pour élts dont configuration électronique se termine par ns^x ou (ns^x, np^y) est donné par le nbre total d'e- sur le niveau n le plus élevé :
 - ns^x : x électrons de valence
 - (ns^x, np^y) : (x+y) électrons de valence
- Pour les élts dont configuration électronique se termine par $[ns^x, (n-1)d^y]$ est donné par le nbre total d'e- sur le niveau ns le plus élevé et sur celui de (n-1)d :
 - $[ns^x, (n-1)d^y]$: (x+y) électrons de valence

Energie d'ionisation ($\Leftrightarrow$ potentiel d'ionisation)

NRJ de 1^{ère} ionisation EI_1 est l'NRJ nécessaire à un atome isolé pour lui arracher un e⁻

$$EI_1 > 0$$

NRJ de n^{ième} ionisation EI_n :

$$EI_n > EI_{n-1}$$

Il existe des discontinuités :

- $EI_1(\text{Be}) > EI_1(\text{B})$
- $EI_1(\text{Mg}) > EI_1(\text{Al})$
- $EI_1(\text{N}) > EI_1(\text{O})$

Affinité électronique AE et Energie de fixation E_{fix}

AE est opposé « en signe » de E_{fix} : $AE = -E_{\text{fix}}$

AE peut être + ou - ; si $AE > 0$: A⁻ a alors une NRJ plus faible que A : ion A⁻ est plus stable que A

Electronégativité EN

Mesure l'aptitude d'un élément à attirer vers lui des e⁻ au sein d'une liaison covalente => apparition de charges partielles

→ Echelle de Mulliken : $EN = \frac{EI_1 + AE}{2}$

→ Echelle de Pauling : basée sur NRJ de dissociation (E_d) en kJ/mol

- E_d (liaison réelle covalente polaire A-B) - Moyenne des E_d A-A et B-B = Δ
- $|EN_{(B)} - EN_{(A)}| = \Delta^{1/2}$ avec Δ = énergie de résonance en eV
- $\Delta = E_d(\text{liaison réelle covalente polaire}) - E_d(\text{liaison covalente à 100\%})$
- $E_d(\text{liaison covalente à 100\%}) = \sqrt{E_{A-A} * E_{B-B}}$

$$|EN_{(B)} - EN_{(A)}| = 0.102 \sqrt{E_{A-B} - \sqrt{E_{A-A} * E_{B-B}}} \text{ en (eV}^{1/2}\text{)}$$

Echelle de Pauling est une échelle relative : EN de F = 4.0 (en eV^{1/2})

Tableau périodique des éléments

- ← nom de l'élément: **gaz**, **liquide** ou **solide** à 0°C et 101,3 kPa)
- ← numéro atomique
- ← symbole chimique
- ← masse atomique relative ou [celle de l'isotope le plus stable]

1 IA	2 IIA											13 IIIA	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA					
hydrogène 1 H 1,00794	hélium 2 He 4,002602											bore 5 B 10,811	carbone 6 C 12,0107	azote 7 N 14,00674	oxygène 8 O 15,9994	fluor 9 F 18,9984032	néon 10 Ne 20,1797				
lithium 3 Li 6,941	béryllium 4 Be 9,012182											aluminium 13 Al 26,9815386	silicium 14 Si 28,0855	phosphore 15 P 30,973762	chlore 17 Cl 35,4527	argon 18 Ar 39,948					
sodium 11 Na 22,98976928	magnésium 12 Mg 24,3050											gallium 31 Ga 69,723	germanium 32 Ge 72,61	arsenic 33 As 74,92160	arsenic 33 As 74,92160	brome 35 Br 79,904	krypton 36 Kr 83,80				
potassium 19 K 39,0983	calcium 20 Ca 40,078											zinc 30 Zn 65,39	nickel 28 Ni 58,6934	cuivre 29 Cu 63,546	argent 47 Ag 107,8682	cadmium 48 Cd 112,411	étain 50 Sn 118,710	plomb 82 Pb 207,2	polonium 84 Po [208,9824]	astate 85 At [209,9871]	radon 86 Rn [222,0176]
rubidium 37 Rb 85,4678	strontium 38 Sr 87,62											rhodium 45 Rh 102,90550	palladium 46 Pd 106,42	argent 47 Ag 107,8682	or 79 Au 196,966569	mercure 80 Hg 200,59	thallium 81 Tl 204,3833	ununtrium 113 Uut [284]	flérovium 114 Fl [289]	livermorium 116 Lv [292]	ununoctium 118 Uuo [294]
caésium 55 Cs 132,9054519	baryum 56 Ba 137,327											iridium 77 Ir 192,217	platine 78 Pt 195,084	or 79 Au 196,966569	mercure 80 Hg 200,59	copernicium 112 Cn [277]	ununtrium 113 Uut [284]	flérovium 114 Fl [289]	livermorium 116 Lv [292]	ununoctium 118 Uuo [294]	
francium 87 Fr [223,0197]	actinides 89-103											osmium 76 Os 190,23	rhénium 75 Re 186,207	bohrium 107 Bh [264,1247]	dubnium 105 Db [262,1144]	seaborgium 106 Sg [266,1219]	tennessine 117 Ts [289]	oganesson 118 Og [289]	tennessine 117 Ts [289]	oganesson 118 Og [289]	

- métaux alcalins
- alcalino-terreux
- lanthanides
- actinides
- métaux de transition
- métaux pauvres
- métalloïdes
- non-métaux
- halogènes
- gaz nobles
- primordial
- désintégration d'autres éléments
- synthétique