ED de neuroradiologie

● Principaux examens en Neuroradiologie

➤ Scanner :

- examen de débrouillage
- mesure du coefficient d'atténuation du RY par le tissu traversé
- hounsfield
 - - 1000 air
 - 1000 os
- Deux fenêtres
 - parenchymateuse → liquides
 - osseuse

- Apports anatomiques :
 - Les ventricules grossissent avec l'âge
 - sinon rechercher HT intracrânienne
 - Le cerveau peut avoir des calcifications (physiologique)
 - NGC (pallidum-
 - plexus choroïdiens
 - epiphyse
 - dure-mère
 - parois artérielles
- Rehaussement physiologique après injection (pas de BHE) :
 - hypophyse et tige pituitaire
 - plexus choroïdes
 - dure-mère
 - contenu des artères et des veines
- CI
 - Sans injection
 - grossesse
 - enfant
 - échographie tant que la fontanelle est ouverte
 - quand même réalisé en cas d'urgence vitale
 - Injection

- insuffisance rénale
 - prévention
 - hydratation +++
 - espacer les injections
 - arrêt des médicaments néphrotoxiques
 - arrêt des biguanides pdt 48h après injection
- myélome
- (allergie)

➤ AngioTDM :

- injection IV de produit de contraste iodé
- **l'allergie à l'iode n'existe pas**
- Acquisition spiralée :
 - déplacement continue de la table d'examen associée à la rotation concomitante du tube à RX
- Exploration
 - TSA (Tronc supra-aortiques)
 - sténose
 - dissection
 - Polygone de Willis
 - sténose
 - anévrysme
 - MAV

➤ Angio-IRM :

- Champ magnétique des noyaux d'H
 - champ magnétique stable B0 déstabilisé par des ondes de radiofréquence qui le perturbent → image en fonction de la vitesse à laquelle les noyaux retrouvent leur état d'équilibre
- De quoi dépend le signal ?
 - densité d'H = densité de p+
 - envt moléculaire de l'H (**T1, T2**)
 - Viscosité du tissu (diffusion)
 - Homogénéité du champ magnétique total (**T2* = T2 sans correction du champ**)
- Séquence TOF = Time of Flight :
 - sans injection
 - basée sur les gb circulants
 - soustraction à l'imagerie des vaisseaux qui ne circulent plus
 - ne montre que les vaisseaux circulants
- CI
 - Pacemaker
 - premier trimestre de grossesse
 - Matériel métallique intracrânien
 - scanner si personne travaille le métal (risque de bout de métal dans les yeux)

- Vav des produits de contraste
 - insuffisance rénale sévère
 - risque : **fibrose systémique néphrogénique**
 - chélate de gadolinium
 - scanner
 - femme enceinte (principe de précaution)
 - allergie

➤ Séquences en IRM :

	T1	T2
Indication	Anatomie et prise de contraste	Anomalies de signal (patho apparaît en hypersignal) Contraste inversé / T1
Structures	Liquides hyposignal SG isosignal NGCs isosignal SB hypersignal Graisse hypersignal	Liquides hypersignal Oedèmes Graisse hypersignal
Dérivé	T1 injecté	T2 Flair : T2 avec LCR noir (urgence) T2* : sans correction des champs magnétiques

➤ Angiographie cérébrale digitalisée par voie IA (DSA):

- Angiographie cérébrale classique
- Référence pour l'études des vaisseaux
- Méca : cathétérisme sélectif d'une artère puis injection de produit de contraste radio-opaque
- Pb :
 - invasif
 - dangereux

➤ Angiographie versus ARM :

- **Sémiologie élémentaire**

➤ Au scanner :

- Isodensité
 - densité des NGC = densité du cortex cérébral
 - densité CG > SB

- Sillons et système ventriculaire
 - Hydrocéphalie → ventricules élargis mais sillons serrés
 - regarder en bas
 - chronique ou aiguë ?
 - aiguë → **résorption trans-épendymaire** : liseré autour du ventricule qui ressemble à du LCR
 - Atrophie cortico-sous-corticale
- Effet de masse
 - Effet d'une structure sur une structure sous-jacente
 - Témoins d'un processus expansif
 - tumeur
 - abcès
 - hématome
 - kyste
 - ...
 - Conséquences
 - déplacement
 - ligne médiane
 - ventricules
 - parenchyme
 - compression des espaces s-a
 - **Risque majeur = engagement**
 - Sous-falcieniel : dépassement de la ligne médiane
 - Temporal (ici droit)
 - Des amygdales cérébelleuse
 - effet de masse sur V4
 - risque : arrêt cardiaque et respiratoire par compression de la moelle allongée (attention aux tumeurs de la fosse postérieure)

<p><i>Engagement sous-falcoriel</i></p>
<p><i>Engagement temporal</i></p>
<p><i>Engagement des amygdales cérébelleuses</i></p>

- **Principales pathologies**

A) Sémiologie TDM

➤ Hématomes sous et extra duraux :

- Extra-dural (HED)
 - sang entre dure-mère et table interne de la voûte
 - fracture + plaie de l'AMM
 - **lentille biconvexe** et hyperdense
- Sous-dural (HSD)
 - sang entre arachnoïde et dure-mère
 - plaie d'une veine corticale
 - **croissant** hyperdense
 - effet de masse

- Association :
 - classique
 - maltraitance

➤ Dater un saignement :

- aigu : hyperdense
- non opéré stade subaigu : isodense
- chronique : hypodense (nécrose)

	<p><i>Epanchement temporal extra-axial de densité hypodense (donc ancien) Effet de masse responsable d'un engagement sous falcoriel</i></p> <p><i>Epanchement extra-axial = hors du parenchyme</i></p>
	<p><i>Hyper et hypodensités Dépôts hématiques d'âge différent Le patient a saigné sur un pb ancien</i></p>

➤ Hémorragie méningée :

- Très douloureuse
- Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) = hémorragie méningée (HM)
 - post-traumatique
 - rupture d'anévrisme, de MAV
 - souvent associée à un hématome intra-cérébral
 - hématome intra-cérébral souvent associé (le patient est tombé)
 - remplit tous les espaces dans le cerveau
 - post-traumatique → on peut voir des bulles d'air (qui apparaissent en noir) qui montrent une fracture de la base du crâne
- QCM : hémorragie méningée

➤ Hématome intracrânien :

- On peut saigner dans le parenchyme

B) Sémiologie IRM

➤ Dater un hématome :

Hématome au stade séquellaire

T1

T2*

➤ Pathologies tumorales intracrâniennes :

- Lésion extra-axiale développée aux dépens de la faux du cerveau (car celle-ci est par définition hors du parenchyme cérébral)
- Topographie lésionnelle

- Oedèmes vasogéniques
 - **hypo T1 hyper T2**
 - respecte le cortex en exerçant un effet de masse
 - aspect : doigt de gant
 - → tumeur avec oedème → on peut discuter l'exérèse
- Prise de contraste
 - rupture de la BHE (comme toute lésion du SNC)
 - néo vascularisation (tumeur devenant maligne)

traduit souvent la malignité des tumeurs intra-parenchymateuses

- Nécrose centro-tumorale
 - tumeur de haut grade
 - nécrose non hémorragique : **hypo T1 hyper T2**
 - nécrose hémorragique : **hyper T1 et T2**

*Nécrose noire (comme le LCR)
Centre nécrotiques (association d'éléments sémiologiques)
Oedème périlésionnel
Discret déplacement de la ligne médiane*

➤ Cas clinique QCM :

Homme de 30 ans, présentant des céphalées d'installation progressive : IRM cérébrale QCM

L'IRM réalisée met en évidence :

- A : Une tumeur sus-tentorielle
- B : Un aspect normal
- C : Une tumeur sous-tentorielle entraînant un engagement des amygdales cérébelleuses
- D Un accident ischémique cérébral
- E Un hématome des noyaux gris centraux

Réponse :

IRM T2 en coupe sagittale

Lésion de V4 bien délimitée, tissulaire avec quelques portions kystiques

Pas bcp d'oedém mais lésion assez grosse pour obstruer V4 (système ventriculaire dilaté au-dessus)

Engagement dans le foramen magnum → urgence vitale

Réponse vraie : C

➤ AVC ischémique :

- Scanner quand pas d'irm
- Gris et blanc touchés en même temps + territoire d'une artère (ex : sylvienne = acm = territoire en triangle)
- Positivité tardive

➤ IRM et Ischémie :

- Séquence de diffusion +++
 - précisément positive
 - sensible

- spécifique
- Principe : mesure de la mobilité de la molécule d'eau dans un tissu
 - Or, dans la phase précoce, l'eau est piégée dans les cellules → la mobilité des molécules d'eau est moindre
- Indice pour cette séquence : ne montre que le cerveau + résolution moche

- 150 000 / an
- Ischémie récente → hypersignal en diffusion et diminution du coefficient de diffusion

ATTENTION : le thalamus est vascularisé par l'ACP

➤ Pathologies de la SB :

- SEP +++
 - lésion ovalaires bien limité à grand axe ventriculaire
 - femme jeune
 - hypersignaux T2 et FLAIR de la SB "disséminés dans le temps et dans l'espace"
 - prédominance
 - périventriculaire (grand axe perpendiculaire / ventricule)
 - corps calleux
 - si ancien : hyposignal T1 (trou noir)

- Leucoaraïose
 - lésion à morphologie variable
 - hypersignaux T2 nodulaire, floconneux, confluents de la SB périventriculaire
 - tâches qui se baladent et fusionnent
 - patients âgés en général

Exploration des vaisseaux intra-crâniens: cochez la ou les réponses exactes.

A La réalisation d'un angio-scanner nécessite toujours une injection de produit de contraste

B La réalisation d'une angio-IRM nécessite toujours une injection de produit de contraste

C Le risque de complication neurologique d'une angiographie digitalisée par voie intra-artérielle est de l'ordre de 0,001 % par examen

D La réalisation d'un angio-scanner ne présente aucun risque

E La réalisation d'une angio-IRM intra-crânienne chez un patient ayant un pacemaker cardiaque ne présente pas de risque car l'examen est centré à l'étage intra-crânien.

Réponse : A

Savoir formuler une demande d'examen

Une demande d'examen :

- Décrit un tableau neurologique, sa date d'installation et son mode de début, brutal ou progressif, son mode évolutif, les antécédents du patient
- Précise les traitements en cours, les pathologies associées, le terrain allergique, la coopération prévisible du patient
- Documente les contre-indications

Une demande d'examen correctement formulée pose une question

Grille de lecture d'un examen neuroradiologique

- **INDICATION :** résume la demande d'examen
- **TECHNIQUE :** principes de réalisation des examens d'imagerie
- **RESULTATS :** connaissances d'anatomie et de pathologies appliquées à l'imagerie
- **CONCLUSION :** répond à la question posée