Item 360 – Fracture de cheville chez l'enfant

	Salter 1	Salter 2	Salter 3	Salter 4
Localisation	**Fibulaire** ++ Décollement épiphysaire pur	**Tibiale** ++ Décollement épiphysaire partiel + trait de fracture métaphysaire	Décollement épiphysaire partiel + fracture épiphysaire => fratcure articulaire ∃ aussi **fracture de Tillaux**	Métaphyso-épiphysaire ∃ **fracture de Macfarland** (mallélole médiale)
Mécanisme	**Varus forcé**		**Rotation latérale**	**Adduction forcée**
Diagnostic	Douleur en regard du cartilage Rx : normales ou œdème	Douleur, impotence, œdème Rx : rech atteinte fibulaire associée, déplacement	Douleur, impotence, œdème Rx : rech fragment osseux intra-articulaire	Douleur, impotence, œdème Rx : rech fragment osseux intra-articulaire, fracture dôme talien, déplacement
Pronostic	Bon	Bon	Bon si réduction parfaite, sinon risque arthrose et épiphysiodèse	Réservé, risque arthrose et épiphysiodèse
Traitement	**Orthopédique** : - Réduction - Botte plâtrée 4-6 semaines - Reprise progressive marche. Complète à 1,5M ou 2M	**Orthopédique** : réduction +/-, plâtre cruro-pédieux 4-6s, reprise progresive appui, totale à 3M **Chirurgie** : si insuffisance de réduction	**Orthopédique** : plâtre cruro-pédiuex 4-6s, reprise progressive activités, totale à 4M **Chirurgie** : si déplacée, osthéosynthèse puis reprise appui progressive	**Orthopédique** : plâtre cruro-pédiuex 4-6s, reprise progressive activités, totale à 4M **Chirurgie** : si déplacée, osthéosynthèse puis reprise appui progressive
				